

Til foreldre/foresatte

Informasjon om utlevering av jod-tabletter i skole og barnehage

Ved en eventuell atomhendelse med nedfall av radioaktivt jod, kan hendelsen spesielt for barn og unge under 18 år føre til kreft i skjoldbruskkjertelen. Inntak av jod-tablett (kaliumjodid) kan redusere kreftrisikoen ved at det blokkeres for opptak av radioaktivt jod. Tablettene har best virkning om de tas innen 4 timer etter eksponering.

Barnehager og skoler har tilgjengelig jod-tabletter til utdeling dersom en hendelse skjer i åpningstiden. Foresatte oppfordres til å kjøpe jod-tabletter på apotek til hjemmebruk.

Barnet skal ikke ha jod-tablett dersom det har:

- Allergi overfor kaliumjodid eller noen andre innholdsstoffer i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget).
- Betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
- Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
- Dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)
- Operert bort skjoldbruskkjertelen

For nærmere informasjon, se www.dsa.no eller www.helsenorge.no

Dersom ditt barn **ikke** skal tildeles jod-tablett ved en atomhendelse, må det gis skriftlig beskjed til barnets skole eller barnehage.

KLIPP HER-----

Svarslipp

Mitt barn:

skal **ikke** tildeles jod-tablett etter en atomhendelse med radioaktivt utslipp

Dato/underskrift:
